



梨树周年病虫害防治技术

—— 东成于道 盛世在德 ——

技术部：张进京

18710054090

北京东成盛世农业科技有限公司



梨树病虫害防治关键期



根据梨树区病虫害发生规律可以分为如下几个防治时期:

- 1、落叶至萌芽前（11月底3月初）
- 2、萌芽至开花前（3月下旬4月上旬）
- 3、落花后至套袋前（4月下旬5月上中旬）
- 4、果实膨大期（5月中下旬8月上中旬）
- 9、果实采收前后（8月上旬到10月下旬）



落叶至萌芽前

这一时期是11月至来年3月初的一段时间，此期梨树尚未萌芽，越冬害虫还没出来活动正好是铲除越冬害虫的最佳时机，很多害虫都在枯枝落叶，老树皮中越冬。

主要防治的对象：

梨木虱、盲蝽蟊、红蜘蛛、梨大食心虫、蚜虫、梨黑星病、轮纹病、腐烂病。

防治措施：

刮除翘起的干树皮、剪除病虫枝，芽萌动期喷3~5度石硫合剂（或50%多菌灵600倍+西普达1500倍+嘉雨2000倍+1%阿维菌素粉剂3000倍）。

萌芽至开花前

3月下旬至4月初，这段时间正是梨蚜、梨木虱、黑星病等病虫害防治关键期。

防治对象：重点防治黑星病、腐烂病、轮纹病、褐斑病、锈病、梨木虱、盲蝽蟊、叶螨和蚜虫类。

防治措施：福递1200~2000倍+竹剑10000倍（5%吡虫啉粉剂2000倍）+1%阿维菌素粉剂3000倍。

落花后至套袋前

防治时期：4月下旬至5月上中旬

防治对象：梨黑星病、轮纹病、褐斑病、炭疽病、锈病、食心虫、盲蝽蟊、梨木虱、黄粉蚜、红蜘蛛、金龟子。

治疗措施：苯醚1500倍+西普达1200倍+嘉雨2000倍+5%噻螨酮粉剂1500~2000倍

果实膨大期

防治对象：黑星病、纶纹病、炭疽病、褐斑病、盲蝽蟊、黄粉蚜、梨木虱、红蜘蛛、食心虫。

麦收前（5月中下旬）：

防治措施：禾技1500倍+3%啉虫脒粉剂1500⁻2000倍+20%螨死净2000⁻3000倍

麦收后（6月中下旬）：

防治措施：福递1500倍+竹剑10000倍（5%吡虫啉2000倍）+20%哒螨灵粉剂1500⁻2500倍

果实速长期（7月上中旬）：

防治措施：苯醚1500倍+西普达1200倍+嘉雨2000倍+5%噻螨酮粉剂1500⁻2000倍

膨果期（7月下旬）：

防治措施：禾技1500倍+3%啉虫脒粉剂1500⁻2000倍+20%螨死净2000⁻3000倍

膨果期（8月上中旬）：

防治措施：福递1500+竹剑10000倍（5%吡虫啉2000倍）+20%哒螨灵粉剂1500⁻2500倍

果实采收前后

防治对象：黑星病、炭疽病、纶纹病、褐斑病、食心虫、盲蝽蟊。

采收前20天左右（8月中下旬）：

防治措施：禾技1500倍+嘉雨2000倍+ 3%啉虫脒粉剂1500~2000倍

采收后（9月底10月初）：

西普达1200倍+苯醚2000倍+竹剑10000倍（5%吡虫啉2000倍）

谢谢大家！