

# 葡萄病虫害防治历

单位：北京东成盛世农业科技有限公司 技术部：张进京

一、**萌芽期（4月初）**：葡萄出土后绒球期喷施 3~5 度石硫合剂，注意要全园喷施（包括地面）。主要目的：铲除越冬虫卵，降低病虫害数量。

二、**萌芽后至开花前（4月-5月）**

1、2~3 叶期（4月中旬），20%苯醚甲环唑 2000 倍+2.5%联苯菊酯 1500 倍。重点防治：黑痘病、白粉病、盲蝽蟥

2、花序分离期(5月上中旬)，福递 1200 倍+金彩 1500 倍+钙博 1500 倍+硼肥。重点防治：霜霉病、炭疽病、灰霉病、黑痘病、穗轴褐枯病、盲蝽蟥、红蜘蛛、介壳虫

去年如果有盲蝽蟥、介壳虫，加入 5%吡虫啉 2000 倍，如果有红蜘蛛加入 20%哒螨灵粉剂 1500~2500 倍。

3、开花前 2~3 天（5月中下旬），禾技 3000 倍+40%啞霉胺 800 倍+嘉雨 2000 倍+5%噻嗪酮粉剂 1500~2000 倍+金彩 1500 倍+钙博 1500 倍+硼肥。防治：灰霉病、穗轴褐枯病、黑痘病、炭疽病、霜霉病、盲蝽蟥、红蜘蛛、透翅蛾、金龟子等

**根据降雨情况，病虫害情况在此期喷 2~3 次药。**

三、**谢花后至套袋前（6月份）**

1、落花后 2~5 天（6月上旬），42%代森锰锌 600 倍+20%苯醚甲环唑 3000 倍+抑霉唑+杀虫杀螨剂+金彩 1500 倍+钙博 1500 倍+硼肥

重点防治：灰霉病、穗轴褐枯病、炭疽病、霜霉病、白腐病、透翅蛾、红蜘蛛、盲蝽蟥。

2、落花后 10~15 天（6月中旬），禾技 3000 倍+杀虫杀螨剂+金彩 1500 倍+钙博 1500 倍。

重点防治：霜霉病、炭疽病、白腐病、黑痘病、盲蝽蟥、红蜘蛛。

3、套袋前（6月下旬），福递 1200 倍+50%抑霉唑 3000 倍+杀虫剂+金彩 1500 倍+钙博 1500 倍。

重点防治：霜霉病、炭疽病、白腐病、灰霉病、盲蝽蟥。

**根据具体情况，使用 2~3 遍药。**

四、**果实膨大期（7月份）**

波尔多液或氢氧化铜每隔 15 天左右喷药一次。

如果发现霜霉病喷诺凡 2000 倍+吡虫啉。

发现白腐病喷禾技 3000 倍+吡虫啉。

重点防治：霜霉病、白腐病、盲蝽蟥。

五、**果实转色至成熟（8-9月份）**

波尔多液或氢氧化铜 15 天左右喷药一次。

如果发现霜霉病喷诺凡 2000 倍+吡虫啉。

发现白腐病喷禾技 3000 倍+吡虫啉。

重点防治：霜霉病、白腐病。

2014 年 3 月 27 日